

На основании Договора № 16ИС048 от 01.02.2016 г., по заявке ООО «ЮНИЛАБ-ВЛАДИВОСТОК», специалистами ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, оказаны медицинские услуги.

1231 «ВПЧ-ПАП тест расширенный жидкостный (комплекс ПЦР исследований на ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 количественно и ПАП-тест методом жидкостной цитологии)»

ФИО клиента:

Дата рождения:

№ Бланка заказа:

Дата взятия биоматериала: 16.09.2024 г.

Материал: Цервикальный соскоб жидкостный

Исследование	Результат	Референсные значения	Ед.изм.
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплексное исследование)	Готов		
ВПЧ-тест	-		
Адекватность образца (количество клеток в образце)	более 500	более 500	
ДНК ВПЧ высокого риска - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы	Не обнаружено	Не обнаружено	
ДНК ВПЧ А9 (16, 31, 33, 35, 52, 58 типы)	Не обнаружено	Менее 3.0	Ig/10 ⁵ клеток
ДНК ВПЧ А7 (18, 39, 45, 59, 68 типы)	Не обнаружено	Менее 3.0	Ig/10 ⁵ клеток
ДНК ВПЧ А5А6 (51, 56 типы)	Не обнаружено	Менее 3.0	Ig/10 ⁵ клеток
ДНК ВПЧ 16 типа	Не обнаружено	Менее 3.0	Ig/10 ⁵ клеток
ДНК ВПЧ 18 типа	Не обнаружено	Менее 3.0	Ig/10 ⁵ клеток
Генотипы ВПЧ высокого риска - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы	Не обнаружено		
ПАП-тест	-		
Адекватность цитологического образца	Адекватный		
Клетки зоны трансформации	Отсутствуют		
Признаки воспаления	Отсутствуют		
Цитологическое заключение по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System - TBS), 2014	Цитограмма без интраэпителиальных поражений (NILM). Реактивные изменения		
Рекомендации по результатам ВПЧ-ПАП-теста / ВПЧ-теста / ПАП-теста согласно алгоритму скрининга *	Рекомендовано проведение повторного исследования через 3 – 5 лет.		
Комментарий врача-цитолога	Отсутствие клеток зоны трансформации может стать причиной ложноотрицательного цитологического заключения. Решение вопроса о повторном цитологическом исследовании на усмотрение лечащего врача-гинеколога по сумме анамнестических данных и результатам ВПЧ-теста, но не ранее чем 2-3 месяца.		
Расшифровка аббревиатур Терминологической системы Бетесда, 2001, 2014	• NILM - Негативные в отношении интраэпителиального поражения или злокачественности • ASC-US - Атипичные клетки плоского эпителия неясного значения • ASC-H - Атипичные клетки плоского эпителия, не позволяющие исключить HSIL • AGC-NOS - Атипичные железистые клетки, без дополнительного уточнения • AGC-FN – Атипичные железистые клетки, позволяющие предположить неоплазию • AGUS - Атипичные железистые клетки неясного значения • LSIL - Низкая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения • HSIL - Высокая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения • HPV - ВПЧ-эффект (койлоцитарная атипия) • CIN 1, 2, 3 - Цервикальная интраэпителиальная неоплазия 1, 2 или 3 степени • CIS - Карцинома in situ • SCC - Плоскоклеточная карцинома • Adca - Аденокарцинома • AIS - Аденокарцинома in situ		
* Профилактика рака шейки матки под редакцией Г.Т.Сухих и В.Н.Прилепской, 2012	American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer, 2012 The Bethesda System for reporting cervical cytology. Definition, criteria, and explanatory notes. L. J. Gorman, R.Nayar (eds.) - Springer, 2004, XXIII. - 191p.		

Заведующая лабораторией:

Пугачева

Пугачева Н.М.